


Proporzione dei gruppi diagnostici principali per età alla diagnosi


Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e dell'istiocitosi a cellule di Langerhans; Proporzioni in percentuale di casi durante il periodo 1994-2023



Incidenza

Per gruppi diagnostici principali, gruppo di età e periodi di 10 anni


Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans; Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



Incidenza

Per sesso, gruppi diagnostici principali e periodi di 10 anni

Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC3-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans; Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.




Stand dati: 14.07.2025
Pubblicato: 18.08.2025
Fonte dati: RdTP, UST

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Incidenza

Per sesso, gruppo di età e periodo di 5 anni

Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



Cancro nei bambini (0-14 anni), 2004-2013

Per gruppi diagnostici principali

Numero di casi (frequenza relativa %), età mediana alla diagnosi (in anni), incidenza per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans

Tipo di cancro		n(%)	Età alla Dx (mediana)	Incidenza	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I	Leucemie	646 (32.3%)	4.00	5.42	1.52
II	Linfomi	230 (11.5%)	10.00	1.93	1.77
III	Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	468 (23.4%)	7.00	3.93	1.18
IV	Neuroblastoma	122 (6.1%)	1.00	1.02	1.03
V	Retinoblastoma	44 (2.2%)	1.00	0.37	0.83
VI	Tumori renali	94 (4.7%)	3.00	0.79	0.92
VII	Tumori epatici	19 (1.0%)	1.00	0.16	1.71
VIII	Tumori ossei	86 (4.3%)	11.00	0.72	1.10
IX	Sarcomi dei tessuti molli	144 (7.2%)	7.00	1.21	1.36
X	Tumori a cellule germinali	61 (3.1%)	7.00	0.51	1.26
XI	Altri carcinomi e melanomi	80 (4.0%)	12.00	0.67	0.57
XII	Altri e neoplasie non specificati	4 (0.2%)	1.50	0.03	1.00
Totale (non include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)		1998 (100.0%)	6.00	16.77	1.28
Istiocitosi a cellule di Langerhans		44 (2.2%)	4.00	0.37	1.10
Totale (include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)		2042 (100.0%)	6.00	17.14	1.28

Abbreviazioni: Dx diagnosi

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 14.07.2025

Pubblicato: 18.08.2025

Fonte dati: RdTP, UST

Cancro nei bambini (0-14 anni), 2014-2023

Per gruppi diagnostici principali

Numero di casi (frequenza relativa %), età mediana alla diagnosi (in anni), incidenza per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans

Tipo di cancro		n(%)	Età alla Dx (mediana)	Incidenza	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I	Leucemie	641 (26.7%)	4.00	5.01	1.26
II	Linfomi	275 (11.5%)	9.00	2.15	2.09
III	Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	655 (27.3%)	7.00	5.12	1.00
IV	Neuroblastoma	146 (6.1%)	1.00	1.14	1.12
V	Retinoblastoma	57 (2.4%)	0.00	0.45	1.59
VI	Tumori renali	119 (5.0%)	3.00	0.93	0.86
VII	Tumori epatici	38 (1.6%)	1.50	0.30	1.24
VIII	Tumori ossei	101 (4.2%)	11.00	0.79	0.71
IX	Sarcomi dei tessuti molli	136 (5.7%)	5.00	1.06	0.84
X	Tumori a cellule germinali	73 (3.0%)	9.00	0.57	0.74
XI	Altri carcinomi e melanomi	152 (6.3%)	12.00	1.19	0.83
XII	Altri e neoplasie non specificati	7 (0.3%)	9.00	0.05	0.40
Totale (non include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)		2400 (100.0%)	6.00	18.76	1.11
Istiocitosi a cellule di Langerhans		45 (1.8%)	5.00	0.35	0.96
Totale (include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)		2445 (100.0%)	6.00	19.11	1.11

Abbreviazioni: Dx diagnosi

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 14.07.2025

Pubblicato: 18.08.2025

Fonte dati: RdTP, UST

Cancro negli adolescenti (15-19 anni), 2004-2013

Per gruppi diagnostici principali

Numero di casi (frequenza relativa %), età mediana alla diagnosi (in anni), incidenza per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans

Tipo di cancro		n(%)	Età alla Dx (mediana)	Incidenza	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I	Leucemie	113 (9.6%)	16.00	2.53	1.51
II	Linfomi	270 (23.1%)	17.00	6.07	1.00
III	Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	171 (14.6%)	16.00	3.83	1.09
IV	Neuroblastoma	2 (0.2%)	19.00	0.04	NA*
V	Retinoblastoma	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI	Tumori renali	15 (1.3%)	16.50	0.34	2.00
VII	Tumori epatici	6 (0.5%)	17.00	0.14	4.89
VIII	Tumori ossei	73 (6.3%)	16.00	1.65	1.43
IX	Sarcomi dei tessuti molli	86 (7.3%)	17.00	1.93	1.52
X	Tumori a cellule germinali	151 (12.9%)	18.00	3.39	5.32
XI	Altri carcinomi e melanomi	279 (23.9%)	18.00	6.27	0.57
XII	Altri e neoplasie non specificati	4 (0.3%)	17.00	0.09	1.04
Totale (non include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)		1170 (100.0%)	17.00	26.27	1.18
Istiocitosi a cellule di Langerhans		2 (0.2%)	19.00	0.04	NA*
Totale (include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)		1172 (100.0%)	17.00	26.32	1.19

Abbreviazioni: Dx diagnosi, NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sesso dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 14.07.2025
Pubblicato: 18.08.2025
Fonte dati: RdTP, UST

Cancro negli adolescenti (15-19 anni), 2014-2023

Per gruppi diagnostici principali

Numero di casi (frequenza relativa %), età mediana alla diagnosi (in anni), incidenza per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans

Tipo di cancro		n(%)	Età alla Dx (mediana)	Incidenza	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I	Leucemie	140 (11.6%)	17.00	3.24	1.70
II	Linfomi	288 (23.9%)	17.00	6.69	1.41
III	Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	214 (17.7%)	17.00	4.97	0.72
IV	Neuroblastoma	10 (0.9%)	17.00	0.24	0.29
V	Retinoblastoma	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI	Tumori renali	8 (0.6%)	16.00	0.18	0.73
VII	Tumori epatici	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VIII	Tumori ossei	75 (6.3%)	17.00	1.75	1.76
IX	Sarcomi dei tessuti molli	65 (5.4%)	17.00	1.51	1.60
X	Tumori a cellule germinali	123 (10.2%)	18.00	2.85	3.43
XI	Altri carcinomi e melanomi	277 (23.0%)	17.00	6.44	0.49
XII	Altri e neoplasie non specificati	7 (0.6%)	18.00	0.16	0.19
Totale (non include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)		1207 (100.0%)	17.00	28.03	1.08
Istiocitosi a cellule di Langerhans		8 (0.7%)	17.00	0.18	2.64
Totale (include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)		1215 (100.0%)	17.00	28.21	1.08

Abbreviazioni: Dx diagnosi, NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sesso dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 14.07.2025
Pubblicato: 18.08.2025
Fonte dati: RdTP, UST