


Proporzione dei gruppi diagnostici principali per età alla diagnosi

Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e dell'istiocitosi a cellule di Langerhans; Proporzione in percentuale di casi durante il periodo 1995–2024




Stand dati: 21.07.2026
Pubblicato: 07.08.2026
Fonte dati: RdTP, UST

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457–67. doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Incidenza

Per gruppi diagnostici principali, gruppo di età e periodi di 10 anni

Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans; Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.




Incidenza

Per sesso, gruppi diagnostici principali e periodi di 10 anni

Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans; Tasso grezzo per 100,000 persone e anno;


Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



Incidenza

Per sesso, gruppo di età e periodo di 5 anni

Tasso grezzo per 100,000 persone e anno; Le barre di errore rappresentano gli intervalli di confidenza al 95%.



Cancro nei bambini (0-14 anni), 2005-2014

Per gruppi diagnostici principali

Numero di casi (frequenza relativa %), età mediana alla diagnosi (in anni), incidenza per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans

Tipo di cancro	n(%)	Età alla Dx (mediana)	Incidenza	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I Leucemie	645 (31.9%)	4.00	5.41	1.52
II Linfomi	235 (11.6%)	10.00	1.97	1.73
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	484 (23.9%)	6.00	4.06	1.22
IV Neuroblastoma	120 (5.9%)	1.00	1.01	1.18
V Retinoblastoma	42 (2.1%)	1.00	0.35	0.83
VI Tumori renali	98 (4.8%)	3.00	0.82	0.78
VII Tumori epatici	18 (0.9%)	1.00	0.15	1.57
VIII Tumori ossei	83 (4.1%)	11.00	0.70	0.93
IX Sarcomi dei tessuti molli	142 (7.0%)	7.00	1.19	1.33
X Tumori a cellule germinali	64 (3.2%)	6.00	0.54	1.13
XI Altri carcinomi e melanomi	90 (4.4%)	12.00	0.75	0.48
XII Altri e neoplasie non specificati	4 (0.2%)	1.50	0.03	3.00
Totale (non include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)	2025 (100.0%)	6.00	16.99	1.26
Istiocitosi a cellule di Langerhans	42 (2.0%)	4.50	0.35	1.21
Totale (include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)	2067 (100.0%)	6.00	17.34	1.26

Abbreviazioni: Dx diagnosi

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 21.07.2026
Pubblicato: 07.08.2026
Fonte dati: RdTP, UST

Cancro nei bambini (0-14 anni), 2015-2024

Per gruppi diagnostici principali

Numero di casi (frequenza relativa %), età mediana alla diagnosi (in anni), incidenza per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans

Tipo di cancro	n(%)	Età alla Dx (mediana)	Incidenza	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I Leucemie	642 (26.9%)	5.00	4.97	1.23
II Linfomi	271 (11.3%)	9.00	2.10	2.01
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	646 (27.1%)	7.00	5.00	1.01
IV Neuroblastoma	151 (6.3%)	1.00	1.17	0.99
V Retinoblastoma	64 (2.7%)	0.00	0.50	1.46
VI Tumori renali	113 (4.7%)	3.00	0.87	0.92
VII Tumori epatici	37 (1.5%)	1.00	0.29	1.18
VIII Tumori ossei	103 (4.3%)	11.00	0.80	0.66
IX Sarcomi dei tessuti molli	141 (5.9%)	5.00	1.09	0.74
X Tumori a cellule germinali	68 (2.8%)	10.00	0.53	0.79
XI Altri carcinomi e melanomi	146 (6.1%)	12.00	1.13	0.82
XII Altri e neoplasie non specificati	6 (0.3%)	7.00	0.05	0.20
Totale (non include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)	2388 (100.0%)	6.00	18.48	1.09
Istiocitosi a cellule di Langerhans	58 (2.4%)	5.50	0.45	0.76
Totale (include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)	2446 (100.0%)	6.00	18.93	1.08

Abbreviazioni: Dx diagnosi

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 21.07.2026
Pubblicato: 07.08.2026
Fonte dati: RdTP, UST

Cancro negli adolescenti (15-19 anni), 2005-2014

Per gruppi diagnostici principali

Numero di casi (frequenza relativa %), età mediana alla diagnosi (in anni), incidenza per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans

Tipo di cancro	n(%)	Età alla Dx (mediana)	Incidenza	Rapporto tra i sessi (maschi/ femmine)
I Leucemie	106 (9.1%)	16.00	2.37	1.52
II Linfomi	279 (24.0%)	17.00	6.24	1.03
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	168 (14.5%)	16.00	3.76	1.20
IV Neuroblastoma	3 (0.2%)	18.50	0.06	NA*
V Retinoblastoma	0 (0.0%)	NA	0.00	NA
VI Tumori renali	11 (1.0%)	16.50	0.25	1.43
VII Tumori epatici	4 (0.4%)	18.00	0.09	NA*
VIII Tumori ossei	69 (6.0%)	16.00	1.55	1.40
IX Sarcomi dei tessuti molli	74 (6.4%)	16.50	1.66	1.51
X Tumori a cellule germinali	152 (13.1%)	18.00	3.40	5.23
XI Altri carcinomi e melanomi	288 (24.8%)	18.00	6.45	0.55
XII Altri e neoplasie non specificati	7 (0.6%)	17.00	0.15	0.85
Totale (non include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)	1161 (100.0%)	17.00	25.99	1.18
Istiocitosi a cellule di Langerhans	2 (0.2%)	19.00	0.04	NA*
Totale (include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)	1162 (100.0%)	17.00	26.03	1.18

Abbreviazioni: Dx diagnosi, NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sesso dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 21.07.2026
Pubblicato: 07.08.2026
Fonte dati: RdTP, UST

Cancro negli adolescenti (15-19 anni), 2015-2024

Per gruppi diagnostici principali

Numero di casi (frequenza relativa %), età mediana alla diagnosi (in anni), incidenza per 100,000 persone e anno, e rapporto tra i sessi; Gruppi diagnostici principali in conformità con ICC-3¹ e istiocitosi a cellule di Langerhans

Tipo di cancro	n(%)	Età alla Dx (mediana)	Incidenza	Rapporto tra i sessi (maschi/femmine)
I Leucemie	129 (10.8%)	17.0	2.98	1.67
II Linfomi	291 (24.4%)	17.0	6.75	1.29
III Tumori cerebrali e altri tumori del SNC	231 (19.3%)	17.0	5.34	0.70
IV Neuroblastoma	9 (0.8%)	17.0	0.21	0.15
V Retinoblastoma	1 (0.1%)	NA*	0.03	NA*
VI Tumori renali	8 (0.6%)	16.0	0.18	0.73
VII Tumori epatici	1 (0.1%)	NA*	0.02	NA*
VIII Tumori ossei	69 (5.7%)	17.0	1.59	1.75
IX Sarcomi dei tessuti molli	66 (5.5%)	17.0	1.52	1.42
X Tumori a cellule germinali	114 (9.5%)	17.0	2.63	2.97
XI Altri carcinomi e melanomi	272 (22.8%)	17.0	6.30	0.52
XII Altri e neoplasie non specificati	5 (0.4%)	17.5	0.11	NA*
Totale (non include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)	1195 (100.0%)	17.0	27.67	1.03
Istiocitosi a cellule di Langerhans	9 (0.8%)	17.0	0.21	1.71
Totale (include l'istiocitosi a cellule di Langerhans)	1204 (100.0%)	17.0	27.88	1.04

Abbreviazioni: Dx diagnosi, NA non applicabile (* dati non riportati per evitare la divulgazione dell'età/sexo dei singoli pazienti)

¹ Steliarova-Foucher E. *et al.* International Classification of Childhood Cancer, Third edition. *Cancer* 2005;103:1457-67.doi: 10.1002/cncr.20910. PMID: 15712273.

Stand dati: 21.07.2026
Pubblicato: 07.08.2026
Fonte dati: RdTP, UST